

ИНСТРУКЦИЯ **по применению препарата ветеринарного «Бутасал -100»** **(BUTASAL-100)**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Бутасал-100 (BUTASALUM-100).
1.2 Бутасал-100 представляет собой прозрачный розовый раствор без механических включений.
В 1,0 мл препарата содержится бутафосфана 100 мг, цианкобаламина 50 мкг.
1.3 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 100 см³.
1.4 Срок годности препарата 3 (три) года при условии хранения в сухом, темном месте при температуре от плюс 15⁰С до плюс 25⁰С; 4 недели – после вскрытия флакона.
Препарат хранят по списку Б.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Бутафосфан представляет собой органическое фосфорсодержащее соединение, используемое в качестве источника фосфора у скота. Фосфор участвует в энергетическом обмене, восполняет содержание уровня фосфора в крови, поддерживает функцию печени и стимулирует мышечную ткань. Его очень низкий уровень токсичности объясняется его физиологическим, а не фармакологическим действием.

Цианкобаламин (витамин В₁₂) участвует в обмене углеводов, белков и липидов, в синтезе лабильных метильных групп, в образовании холина, метионина, нуклеиновых кислот, восстанавливает некоторые дисульфидные соединения в сульфгидрильные. Витамин В₁₂ (цианкобаламин) участвует в кроветворении, жировом и углеводном обмене; является одним из веществ, необходимых для здоровья репродуктивных органов животных. Цианкобаламин используется для профилактики и лечения анемии, вызванной недостаточностью цианкобаламина.

2.2 Основным путем выведения бутафосфана является моча. Бутафосфан покидает организм преимущественно в неизменном виде.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Бутасал-100 применяют при нарушениях обмена веществ (замедлении роста и развития у молодых животных), для профилактики бесплодия, при стрессах, истощении, кетозе, снижении иммунитета.

3.2 Препарат вводят внутривенно (капельно), внутримышечно или подкожно в течение 4-5 дней в следующих дозах:

- лошади и взрослый крупный рогатый скот: 5-25 см³
- телята и жеребята: 5-12 см³
- козы и овцы: 2,5-5 см³
- ягнята и козлята: 1,5-2,5 см³
- свиньи: 2,5-10 см³
- поросята: 1-2,5 см³
- собаки и кошки: 0,5-5 см³

- В случае хронических заболеваний вводят половину дозы с промежутками в 1-2 недели или менее.

- Здоровым животным с профилактической целью вводят половину дозы.

Домашней птице препарат дают перорально, разбавляя с питьевой водой из расчета:

- куры-несушки: 0,5 см³ препарата на птицу в день в течение 2 – 7 дней;
- бройлеры: 0,3 см³ препарата на птицу в день в течение до 5 дней.

3.3 При соблюдении предписанного режима дозировок побочные действия не наблюдаются.

3.4 Продукты животноводства и птицеводства разрешается использовать без ограничений.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать меры предосторожности и личной гигиены: пользоваться спецодеждой и резиновыми перчатками. Запрещается во время работы принимать пищу, пить воду, курить. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 «Интерхеми веркен «Де Аделаар» Б.В.», Эстония.

Инструкция на ветеринарный препарат «Бутасал-100» подготовлена ООО «Тениза» (Н.К.Розенков) на основании документов, представленных изготовителем – «Интерхеми веркен «Де Аделаар» Б.В.».

