

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. Власов

«16» марта 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению АЛЬДЕКОК® ИКС Д для дезинфекции и дезинвазии объектов
ветнадзора и профилактики инфекционных заболеваний животных

(организация-производитель: «ЭВАБО Хемикалиен ГмбХ» /
«EWABO Chemikalien GmbH & Co.KG», Германия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. АЛЬДЕКОК® ИКС Д (ALDECOC® XD)- дезинфицирующее средство в форме раствора, предназначенное для дезинфекции и дезинвазии объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных.

2. АЛЬДЕКОК® ИКС Д содержит в своем составе в качестве действующего вещества хлорокрезол – 21%, а в качестве вспомогательных компонентов спирт этиловый, лаурил сульфат, метил салицилат и воду дистиллированную.

3. По внешнему виду АЛЬДЕКОК® ИКС Д представляет собой прозрачную жидкость янтарного цвета с характерным запахом. Смешивается с водой в любых соотношениях.

4. АЛЬДЕКОК® ИКС Д выпускают расфасованным по 1 дм³ в полимерные бутылки; по 5 дм³, 10 дм³, 25 дм³ в полимерные канистры с по 200 дм³ в полимерные или металлические бочки.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, названия, назначения и способа применения средства, названия и содержания действующего вещества, объема в упаковке, номера партии (серии), даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия и снабжают инструкцией по применению.

Хранят АЛЬДЕКОК® ИКС Д в закрытой упаковке производителя в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 25°С.

Срок годности дезинфицирующего средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. После вскрытия оригинальной упаковки АЛЬДЕКОК® ИКС Д должен быть использован в течение 3 месяцев. Рабочие растворы при условии их хранения в закрытых емкостях в темном месте при температуре не выше 20°С, сохраняют свою активность в течение 1,5 месяца.

АЛЬДЕКОК ИКС Д по истечении срока годности не должен применяться.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. АЛЬДЕКОК ИКС Д обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов. Активен также против ооцист кокцидий, яиц ряда гельминтов. Механизм

действия хлорокрезола обусловлен его способностью сорбироваться компонентами цитоплазматической мембраны бактерий, ооцист кокцидий и яиц гельминтов, образовывать прочные водородные связи с белками и повреждать мембрану, в частности повышая ее проницаемость для ионов (прежде всего калия) и важных метаболитов, теряемых клеткой, а также для воды, которая поступает извне и способствует лизису.

6. По степени воздействия на организм АЛЬДЕКОК ИКС Д относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76). Рабочие растворы умеренно раздражают кожу и слизистые оболочки глаз, не обладают сенсibiliзирующим действием.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. АЛЬДЕКОК® ИКС Д применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринарного надзора:

- животноводческих, включая птицеводческие и звероводческие, помещений, находящегося в них технологического оборудования, вспомогательных объектов животноводства и инвентаря по уходу за животными;

- автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных средств (используемых для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения), а также открытых объектов (рампы, эстакады, платформы), мест скопления животных (территория и объекты предубойного содержания, рынков, выставок, спортплощадок и др.);

- помещений, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках, вивариях, ветеринарных лечебницах и клиниках.

8. Дезинфекцию проводят путем мелкокапельного орошения поверхностей помещений и технологического оборудования в отсутствие животных, продуктов убоя и продукции животного происхождения с использованием распыляющего оборудования.

Рабочие растворы готовят путем добавления соответствующего количества АЛЬДЕКОК® ИКС Д в воду. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100% вещество.

9. Профилактическую дезинфекцию вышеперечисленных объектов проводят 2% раствором при норме расхода 0,4 л/м² и экспозиции 3 часа.

10. Вынужденную дезинфекцию вышеперечисленных объектов проводят 4% раствором при норме расхода 0,4 л/м² и экспозиции 3 часа.

11. Допускается проведение локальной дезинфекции и дезинвазии отдельных свободных от животных станкомест в занятых животноводческих помещениях, отдельных единиц оборудования и участков поверхности (столы, полы, стены и др.) при условии наличия вентиляции помещений и отсутствия людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

12. По истечении установленной экспозиции обеззараживания кормушки, поилки и другие доступные для животных участки поверхностей, места непосредственного контакта с сырьем, продукцией животного происхождения, места возможного скопления остатков дезсредства обмывают водой. С остальных поверхностей смывания остатков средства не требуется. Животных вводят в помещения после проветривания (открывают окна, двери, люки, включают вентиляцию).

13. Контроль качества проведенной дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г.).

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

14. При приготовлении и применении рабочих растворов необходимо строго соблюдать меры предосторожности и личной безопасности. К работе не допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

15. Все работы с АЛЬДЕКОК® ИКС Д проводят с использованием средств индивидуальной защиты: защитные очки и перчатки, защита органов дыхания от воздействия паров/пыли/аэрозоля.

16. Во время работы с АЛЬДЕКОК® ИКС Д запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть водой с мылом, рот прополоскать.

17. При попадании АЛЬДЕКОК® ИКС Д на кожу или слизистые оболочки его тотчас тщательно смывают струей воды. При попадании в глаза следует промыть их под струей воды в течение 2-3 минут.

18. При попадании АЛЬДЕКОК® ИКС Д или его растворов в желудок пострадавшему дать выпить несколько стаканов воды с 8-10 таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления следует обратиться к медицинскому работнику.

19. Запрещается использовать тару из-под АЛЬДЕКОК® ИКС Д для бытовых целей.

20. АЛЬДЕКОК® ИКС Д следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «Интер-Вет-Сервис» (г. Москва)

Организация-производитель: ЭВАБО Хемикалиен ГмбХ»/«EWABO Chemikalien GmbH & Co.KG» Kolpingstrasse 4 D-49835 Wietmarschen, Германия.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВЧ-5-1.0/03060