

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Эндометрамага-Т[®]
для лечения и профилактики эндометрита у коров
(организация-разработчик: ЗАО «Мосагроген», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эндометрамаг-Т[®] (Endometramag-T[®]).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: тилозина тартрат, пропранола гидрохлорид.

2. Лекарственная форма: раствор для внутриматочного применения. Эндометрамаг-Т[®] в 1 мл в качестве действующих веществ содержит пропранолола гидрохлорида – 17 мг, тилозина тартрата - 10 мг, а в качестве вспомогательных веществ: пропиленгликоль – 0,4 мл, метилцеллюлозу - 3 мг, трилон – 0,01 мг и воду для инъекций – до 1 мл. По внешнему виду препарат представляет собой опалесцирующую жидкость желтого цвета.

3. Эндометрамаг-Т[®] выпускают расфасованным по 0,5 и 1 л в полиэтиленовые канистры соответствующей вместимости, которые закрывают резьбовыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°С до 25°С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применение Эндометрамага-Т[®] по истечении срока годности.

5. Эндометрамаг-Т[®] следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Утилизация неиспользованного препарата производится в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Эндометрамаг-Т[®] относится к антибактериальным препаратам группы макролидов для внутриматочного введения.

Тилозин – действующее вещество Эндометрамага-Т[®] – обладает бактериостатическим действием в отношении грамположительных (кокков, коринобактерий, клостридий, эризипелотрикс) и некоторых грамотрицательных микроорганизмов (пастерелл, гемофилюсов, бруцелл),

вибрионов, лептоспир, риккетсий, спирохет, микоплазм, хламидий. Пропранолол усиливает сократительную способность миометрия матки, что способствует более быстрому отделению последа, а при эндометрите – удалению гнойного содержимого из матки.

Входящие в состав препарата тилозин и пропранолол слабо всасываются слизистой оболочкой матки, что предотвращает их накопление в различных органах и тканях животных. Время полного выведения из организма тилозина составляет 48 часов, а пропранолола – 12 часов после последнего введения препарата.

Препарат малотоксичен для теплокровных животных, в рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего действия.

Эндометрамаг-Т[®] по степени воздействия на организм согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).

III. Порядок применения

8. Эндометрамаг-Т[®] применяют для лечения и профилактики эндометрита у коров.

9. Лекарственный препарат нельзя применять при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата.

10. Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Для лечения эндометрита препарат вводят внутриматочно в дозе 50-150 мл с помощью шприца Жанэ с интервалом 24-48 часов до клинического выздоровления. Курс лечения составляет 3-5 введений. При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение 1,5-2,0 минут.

Для профилактики эндометритов препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 50-150 мл с помощью шприца Жанэ после отделения последа, абортов или оказания помощи при осложненных и патологических родах.

11. Симптомы передозировки у коров не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести препарат как можно скорее.

14. При применении Эндометрамага-Т[®] в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

15. Не допускается одновременное применение Эндометрамага-Т[®] с ксилазином, ксиланитом, рометаром, ромпуном.

16. Молоко, полученное от животных в период лечения и в течение суток после последнего введения препарата, запрещается использовать для пищевых целей. Такое молоко можно использовать в корм животным после кипячения.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после прекращения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, после термической обработки может быть использовано для кормления пушных зверей.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Эндометрамагом-Т[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эндометрамагом-Т[®]. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Мосагроген»; 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Инструкция разработана ЗАО «Мосагроген», 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационное удостоверение выдано компании ЗАО «Мосагроген» (г. Москва).

Номер регистрационного удостоверения.....

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению Эндометрамага-Т[®], утвержденная Россельхознадзором 07.08.2007 г.