

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Раствора йода спиртового 5 %
в качестве антисептического средства для животных

(организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Раствор йода спиртовой 5 % (Solutio Iodi spirituosa 5 %).

Международное непатентованное название: йод.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Раствор йода спиртовой 5% в 100 г в качестве действующего вещества содержит йод – 5 г, а в качестве вспомогательных веществ - калий йодистый – 2 г, спирт этиловый ректификованный и воду дистиллированную поровну - до 100 г.

По внешнему виду Раствор йода спиртовой 5 % представляет собой прозрачную жидкость красно-бурого цвета с характерным запахом йода.

3. Выпускают Раствор йода спиртовой 5 % расфасованным во флаконы и бутылки из оранжевого стекла, с навинчивающимися крышками или в темные полимерные бутылки, флаконы соответствующей вместимости.

4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от минус 30⁰С до 25⁰С.

Срок годности Раствора йода спиртового 5% при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. Запрещается использовать Раствор йода спиртовой 5% после окончания срока годности.

5. Раствор йода спиртовой 5% следует хранить в местах недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Раствор йода спиртовой 5 % относится к антисептическим лекарственным препаратам наружного применения.

Раствор йода спиртовой 5 % обладает антимикробным, раздражающим, отвлекающим действием, ускоряет заживление ран.

По степени воздействия на организм Раствор йода спиртовой 5% относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Раствор йода спиртовой 5% применяют наружно:

- для обработки операционного поля, мест инъекций, а также пальцев рук хирурга;
- при свежих порезах, травмах, фурункулезе, свищах;
- как раздражающее и отвлекающее средство при хронических воспалениях суставов, сухожилий, мышц и кожи.

9. Противопоказанием к применению Раствора йода спиртового 5% является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата.

10. При наружном применении лекарственным препаратом смазывают поверхность кожи, при наличии ран смазывают кожу у краев ран, не нанося на раневую поверхность. Для отвлекающего действия наносят раствор на кожу в виде сетки.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушений обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее, далее интервал между обработками не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Раствора йода спиртового 5% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении индивидуальных реакций (покраснение кожи, зуд) обработку прекращают.

15. Применение Раствора йода спиртового 5% не исключает использование других лекарственных препаратов.

16. Продукты животноводства во время и после применения Раствора йода спиртового 5% используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Раствором йода спиртовым 5% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с

лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Раствором йода спиртовым 5%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы и бутылки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Раствора йода спиртового 5%, утвержденная Россельхознадзором 25 декабря 2006 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения