

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата «ИНТЕРСПЕКТИН-Л»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Интерспектин-Л (Interspectinum-L)

1.2 Интерспектин-Л представляет собой прозрачный бесцветный или светло-желтый раствор без механических включений.

В 1,0 мл препарата содержится спектиномицина основания - 100 мг, линкомицина основания - 50 мг, вспомогательные и формообразующие вещества.

1.3 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 100 мл.

1.4 Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, темном месте при температуре от + 15 до + 25 °С.

Срок годности препарата - 3 (три) года от даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Комбинация линкомицина и спектиномицина обладает аддитивным и, в некоторых случаях, комбинированным действием.

Спектиномицин - аминоциклический антибиотик ингибирует синтез белка в микробной клетке на уровне рибосом. Спектиномицин обладает бактериостатическим или бактерицидным действием в зависимости от дозы, главным образом в отношении грамотрицательных бактерий.

2.2 Линкомицин относится к группе линкозамидов. Механизм противомикробного действия основан на связывании с 50S рибосомальными субъединицами чувствительных к препарату микроорганизмов, что приводит к подавлению образования пептидных связей при синтезе бактериального белка. Линкомицин обладает бактериостатическим действием в основном против грамположительных бактерий (стафилококки, стрептококки и др.), микоплазм.

Может возникнуть перекрестная резистентность линкомицина с макролидами.

2.3 Линкомицин и спектиномицин выделяются в основном с мочой и фекалиями.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Интерспектин-Л применяют при желудочно-кишечных инфекциях и инфекциях дыхательных путей у телят, кошек, собак, коз, овец, свиней, вызванные чувствительными к линкомицину и спектиномицину микроорганизмами, такими как бактерия *Сampylobacter*, кишечная палочка, микоплазма, сальмонелла, стафилококки, стрептококки, бактерии рода *трепонема* и др.

3.2 Препарат вводят внутримышечно 1-2 раза в день в следующих дозах:

- телята: 1 мл на 10 кг массы тела в течение 4 дней;

- козы и овцы: 1 мл на 10 кг массы тела в течение 3 дней;

- свиньи: 1 мл на 10 кг массы тела в течение 3 - 7 дней;

- кошки и собаки: 1 мл на 5 кг массы тела в течение 3 - 5 дней (максимум 21 день).

3.3 Препарат противопоказан при гиперчувствительности к линкомицину и/или спектиномицину, при нарушении функции почек и/или печени.

Препарат не рекомендуется назначать с пенициллинами, макролидами, цефалоспоридами, хинолонами, циклосерином и каолином.

Запрещается препарат вводить лошадям.

3.4 Побочные действия: аллергические реакции. После инъекции может наблюдаться небольшая боль, зуд или диарея.

3.5 Убой животных (телята, козы, овцы и свиньи) на мясо разрешается не ранее чем через 14 дней после последнего использования препарата.

В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

Период ожидания по использованию молока - 3 дня после последнего введения препарата.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 «Интерхеми веркен «Де Аделаар» Б.В.», Эстония.

Инструкция подготовлена ООО «Тениза» на основании документов, представленных производителем – «Интерхеми веркен «Де Аделаар» Б.В.», Эстония

