

## **ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата «Интровит-Е-Селен» (Introvit-E-Selen)**

### **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1 Интровит-Е-Селен (Introvit-E-Selen)

1.2 Интровит-Е-Селен представляет собой раствор от светло-желтого до темно-желтого цвета без механических включений.

В 1,0 мл препарата содержится: витамин Е (альфа-токоферола ацетат) - 50 мг, натрия селенит - 0,5 мг.

1.3 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 100 мл.

1.4 Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, темном месте при температуре от + 15<sup>0</sup>С до + 25<sup>0</sup>С.

Срок годности препарата составляет 3 (три) года от даты изготовления.

### **2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

2.1 Витамин Е является внутриклеточным антиоксидантом, участвующим в стабилизации плазматических мембран клеток. Его основная функция заключается в снижении интенсивности свободно-радикальных процессов.

2.2 Селен является жизненно необходимым биологически активным веществом для животных. Он входит в состав активного центра глутатионпероксидаз, которые играют важную роль в разрушении свободных радикалов и гидроперекисных субстратов.

### **3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА**

#### **3.1 Показания к применению**

Интровит-Е-Селен применяют при недостаточности витамина Е у телят, крупного рогатого скота, коз, овец и свиней. Препарат эффективен при таких заболеваниях как энцефаломалация, мышечная дистрофия, атопический диатез, а также при бесплодии.

Препарат применяют для профилактики интоксикации железом у поросят.

#### **3.2 Доза**

Препарат вводят подкожно или внутримышечно в следующих дозах:

- телята, козы и овцы: 2,0 мл на 10 кг массы тела, повторно - через 2-3 недели;

- свиньи: 1,0 мл на 10 кг массы тела, повторно - через 2-3 недели.

#### **3.3 Побочные действия**

При соблюдении предписанного режима дозировок не должны наблюдаться побочные действия.

#### **3.4 Противопоказания**

Противопоказано совместное применение препарата с препаратами железа и минеральными маслами.

#### **3.5 Период выведения препарата**

Отсутствует.

### **4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать меры предосторожности и личной гигиены: пользоваться спецодеждой и резиновыми перчатками.

4.2 Запрещается во время работы принимать пищу, пить воду, курить.

4.3 После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

## 5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ




5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

## 6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

«Интерхеми веркен «Де Аделаар» Б.В.», Эстония.

Инструкция подготовлена ООО «Тениза» на основании документов, представленных производителем – «Интерхеми веркен «Де Аделаар» Б.В.», Эстония

Ветбиофармсовет при Департаменте ветеринарного и продовольственного контроля МСХ И П РБ	
<b>ОДОБРЕНО</b>	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
«31» 40	2013, протокол № 69