



31 АВГ 2012

Е.А.Непоклонов

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Катозала для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности у животных

(организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH», Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Катозал (Catosal).
Международное непатентованное наименование: бутофосфан и цианокобаламин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Катозал в 100 мл в качестве действующих веществ содержит бутофосфан - 10,0 г, цианокобаламин - 0,005 г, а также вспомогательные компоненты: метил-4-гидроксibenзоат - 0,1 г, гидроксид натрия – 0,004 г, воду для инъекций – до 100 мл. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость розового цвета.

3. Выпускают лекарственный препарат в виде стерильного раствора, расфасованным в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы поштучно упакованы в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

4. Хранят Катозал в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 5 лет с даты производства.

Катозал по истечении срока годности не должен применяться.

5. Катозал следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Катозал относится к комплексным препаратам, предназначенных для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности.

Катозал обладает тонизирующими свойствами, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию животных.

Катозал по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

III. Порядок применения

8. Катозал назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям и птице при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии;
- как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостаточностью в организме кальция и магния;
- при родах, а также в целях профилактики послеродовых осложнений (тетания, родильный парез);
- при тяжелых физических нагрузках и повышенной физической активности у спортивных лошадей (за 2-3 дня до соревнований).

9. Противопоказанием к применению Катозала является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Катозал применяют крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно), птице – перорально с водой для поения в течение 4-5 дней, в разовых дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Доза (мл на животное)
Взрослые лошади и крупный рогатый скот	10,0-25,0
Жеребята, телята	5,0-12,0
Взрослые овцы и козы	2,5-8,0
Ягнята, козлята	1,5-2,5
Взрослые свиньи	2,5-10,0
Поросята-сосуны, подсвинки	1,0-2,5
Куры-несушки, бройлеры	2,0-3,0 мл на 1 л питьевой воды
Цыплята, ремонтный молодняк	1,0-1,5 мл на 1 л питьевой воды
Собаки	0,5-5,0
Кошки, пушные звери	0,5-2,5

При хроническом течении болезни назначают $\frac{1}{2}$ дозы Катозала, указанной в таблице. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5-14 дней.

11. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

13. В случае пропуска одной или нескольких доз применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Катозал в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

15. Катозал не заменяет и не исключает использование антибактериальных и других средств этиотропной терапии.

16. Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мясопродуктов, молока и яиц во время и после применения Катозала разрешается на общих основаниях.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом Катозал следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Катозалом. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель фирма «Bayer HealthCare LLC»; 12707, Shawnee Mission Parkway Shawnee, Kansas 66201-0390, USA.

Адрес места производства: 12707, Shawnee Mission Parkway Shawnee, Kansas 66201-0390, USA.

Инструкция разработана компанией «Bayer Animal Health GmbH» (Германия) совместно с ЗАО «Байер» (123022, Москва, Б. Трехгорный пер., д.1, стр.1).

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию, утвержденную Россельхознадзором 26.02.2009 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер