

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Лацилина для лечения послеродовых осложнений у коров  
(организация-производитель ООО «Репровет», Московская обл.)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Лацилин (Lacylin) - лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное для лечения послеродовых осложнений у коров.

2. Лацилин содержит в качестве действующих веществ гомеопатические субстанции: Pulsatilla vulgaris D3 (прострел обыкновенный) - 4%, Secale cornutum D4 (спорынья пурпурная) - 4%, Licopodium clavatum D4 (плаун булавовидный) - 4%, Lachesis mutus D10 (яд змеи сурукуку) - 4%, Acidum Nitricum D6 (кислота азотная) - 4% и вспомогательный компонент - натрия хлорида изотонический 0,9% раствор для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственное средство представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

4. Лацилин выпускают в виде стерильного раствора, расфасованного по 100 см<sup>3</sup> в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упаковывают по 50 штук в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

Каждый флакон маркируют с указанием: организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения лекарственного средства, названия и содержания действующих веществ, объема во флаконе, надписей «Для животных», «Стерильно», номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, номера государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия, обозначения СТО.

Хранят лекарственное средство в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5<sup>0</sup> С до 25<sup>0</sup> С.

Срок годности Лацилина в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения - 24 месяца со дня изготовления, после вскрытия флакона - не более 48 часов. Неиспользованный в течение 48 часов Лацилин подлежит обеззараживанию кипячением в течение 20 мин с последующей утилизацией. Лацилин по истечении срока годности не должен применяться.

### II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Активные компоненты Pulsatilla vulgaris, Secale cornutum, Lachesis mutus и Acidum Nitricum, входящие в состав Лацилина, обладают синергетическим стимулирующим действием на сократительную функцию миометрия и оказывают противовоспалительный эффект. Lachesis mutus стимулирует иммунитет и усиливает бактериостатическое действие маточной слизи; Licopodium clavatum обладает выраженным антитоксическим действием.

6. По степени воздействия на организм Лацилин относится к мало опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего, алергизирующего, эмбриотоксического, тератогенного действия.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Лацилин назначают коровам для лечения послеродовых осложнений, включая катаральные, гнойно-катаральные и субклинические эндометриты и субинволюцию матки.

8. Лацилин применяют коровам, начиная с 8-10 дня после отела, внутримышечно в дозе 5 см<sup>3</sup> на животное один раз в сутки:

- при субинволюции матки - 3-4 -кратно с интервалом 24 часа;
- при остром и хроническом катаральном эндометрите - 4 -кратно с интервалом 2-3 дня;
- при остром гнойно-катаральном эндометрите - 5-7 раз с интервалом 24 часа;

9. Применение Лацилина не исключает использование средств специфической и патогенетической терапии.

10. Побочных явлений и осложнений при применении Лацилина не установлено.

11. Продукцию животноводства в период лечения и после последнего применения Лацилина разрешается использовать без ограничений.

### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При работе с препаратом Лацилин следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

13. Лацилин следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «Репровет», Московская область  
Организация-производитель: ООО «Репровет»; 140560, Московская обл., г. Озеры,  
ул. Юрия Сергеева, д. 39-а.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»  
Регистрационный номер ПВР -2- 3.9/02401