

Инструкция рассмотрена и одобрена
на Ветбиофармсовете
«31» октября 2013 г.
Протокол № 69.

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата «Лимоксин-25 Спрей» (Limoxin-25 Spray)

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Лимоксин-25 Спрей (Aerosolum Lemoxinum-25 Spray)

1.2 Лимоксин-25 Спрей - антисептический препарат для наружного применения, представляющий собой аэрозоль (спрей) от фиолетового до фиолетово-голубого цвета.

В 1,0 мл препарата содержится: окситетрациклина гидрохлорид - 25 мг, генцианвиолет - 5 мг.

1.3 Препарат упаковывают в металлизированные флаконы (баллоны) по 200 мл.

1.4 Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, темном месте при температуре от +15⁰С до +25⁰С.

Срок годности препарата составляет 3 (три) года от даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Окситетрациклин относится к группе тетрациклинов и обладает бактериостатическим действием против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как *Bordetella*, *Campylobacter*, *Chlamydia*, *E. Coli*, *Haemophilus* spp., *Mycoplasma*, *Pasteurella*, *Rickettsia*, *Salmonella*, *Staphylococcus* и *Streptococcus*. Действие окситетрациклина основано на подавлении бактериального синтеза протеина.

Генцианвиолет является красителем, который обладает как антигрибковыми свойствами, так и антибактериальным действием против бактерий рода стафилококки.

2.2 Окситетрациклин в основном выделяется с мочой, небольшая часть с желчью и у животных в период лактации с молоком.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Показания к применению

Инфекционные заболевания кожи, сосков, копыт у крупного рогатого скота, коз, овец и свиней.

3.2 Доза

Распылять 1-2 раза в день с расстояния 15 - 20 см в течение 1-2 секунд.

3.3 Побочные действия

Аллергические реакции.

3.5 Противопоказания

Гиперчувствительность к тетрациклинам.

Назначение животным с серьезными нарушениями функции почек и/или печени.

Назначение параллельно с пенициллинами, цефалоспоридами, хинолонами и циклосерином.

3.6 Период выведения препарата

Отсутствует.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники безопасности.

4.2 Запрещается распылять в глаза и рядом с глазами.

4.3 Не поджигать и не протыкать баллон с аэрозолем.

4.4 Не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

«Интерхеми веркен «Де Аделаар» Б.В.», Эстония.

Инструкция подготовлена ООО «Тениза» на основании документов, представленных производителем – «Интерхеми веркен «Де Аделаар» Б.В.», Эстония

