



Products and People
you can rely on!

Макролан-200 – инструкция по применению

Водный раствор для парентерального применения.

Состав:

Содержится в 1 мл:

Тилозин основание.....200 мг
Растворитель.....1 мл.

Описание:

Тилозин является макролидным антибиотиком, обладающим бактериостатическим действием против главным образом грамположительных бактерий, таких как бактерия *Campylobacter*, микоплазма, бактерия *Pasteurella*, стафилококки, стрептококки и бактерии рода *трепонема*.

Показания:

Желудочно-кишечные инфекции и инфекции дыхательных путей у телят, крупного рогатого скота, коз, овец и свиней, вызванные чувствительными к тилозину микроорганизмами, такими как бактерия *Campylobacter*, микоплазма, бактерия *Pasteurella*, стафилококки, стрептококки и бактерии рода *трепонема*.

Противопоказания:

Гиперчувствительность к тилозину.

Назначение параллельно с пенициллинами, цефалоспоридами, хинолонами и циклосерином.

Побочные действия:

После внутримышечного применения могут наблюдаться местные реакции, которые проходят через несколько дней.

Может наблюдаться диарея, боли в надчревной области и сенсibilизация кожи.

Дозировка:

Для внутримышечного применения:

Общая : 1 мл на 10 - 20 кг массы тела в течение 3 - 5 дней.

Время выведения препарата:

- Для мяса : 10 дней.
- Для молока : 3 дня.

Предупреждение: Держать в недоступном для детей месте.

Упаковка: Ампула 100 мл