

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Тетрамага® для профилактики и
лечения гипо- и авитаминозов у сельскохозяйственных животных
(организация-разработчик: ЗАО «Мосагроген», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тетрамаг® (Tetramag®).

Международное непатентованное наименование: витамин А+витамин D₃+витамин Е+витамин F.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Тетрамаг® содержит в 1 мл в качестве действующих веществ: витамина А - 50000 МЕ*, витамина D₃ - 25000 МЕ, витамина Е - 20 мг, витамина F - 5 мг и вспомогательное вещество: растительное масло (подсолнечное или оливковое) - до 1 мл.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Лекарственный препарат по внешнему виду представляет собой маслянистую жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета со слабым запахом растительного масла.

3. Тетрамаг® выпускают расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупороенные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. После вскрытия флакона неиспользованный препарат хранению не подлежит. Запрещается применение Тетрамага® по истечении срока годности.

5. Тетрамаг® следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

* МЕ – международные единицы

II. Фармакологические свойства

7. Тетрамаг[®] относится к комплексным витаминным препаратам. Комбинация витаминов А, D₃, Е, F, действуя синергически, нормализует обмен веществ, предотвращает развитие гипо- и авитаминозов и заболеваний, развивающихся на их фоне.

Тетрамаг[®] по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Тетрамаг[®] применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, ксерофтальмии, рахита, остеомаляции, тетании, энцефаломалиции, токсической дистрофии печени, дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений слизистых оболочек у сельскохозяйственных животных, а также для повышения их плодовитости и жизнеспособности молодняка.

9. Противопоказанием к применению Тетрамага является индивидуальная повышенная чувствительность животного к витаминам, входящим в состав препарата.

10. Тетрамаг вводят животным с профилактической целью внутримышечно или подкожно один раз в две недели, с лечебной целью - один раз в неделю.

Вид животных	Доза на животное, мл
Крупный рогатый скот	5 - 6
Лошади	3 - 5
Жеребята, телята	2 - 3
Овцы, козы	1 - 2
Ягнята	0,5 - 1
Свиньи	3 - 5
Поросята-отъёмыши	1 - 2
Ремонтный молодняк	1 - 2
Поросята-сосуны	0,5 - 1
Новорожденные поросята	0,5

При необходимости препарат применяют повторно через месяц. Супоросным свиноматкам препарат вводят за 1,5 - 2,0 месяца до опороса, коровам - за 3 - 4 месяца до отела.

11. При передозировке у животных может наблюдаться гипервитаминоз.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Предусмотрено однократное введение препарата.

14. При применении Тетрамага[®] в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и

назначают животным антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Тетрамаг® запрещается смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами. Лекарственный препарат совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами. При применении препарата рационы кормления животных должны быть сбалансированы по кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

16. Во время использования препарата продукты животноводства употребляются в пищу без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Тетрамагом® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тетрамагом®. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Мосагроген»; 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Место производства лекарственного препарата: ЗАО «Мосагроген»; 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Инструкция разработана ЗАО «Мосагроген», 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению препарата Тетрамаг® утвержденная Россельхознадзором 26.11.2007 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения.....