

## Наставление по применению Тилозинокара

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тилозинокар (Tilozinocarium) – комплексный препарат, в состав которого входят тилозина тартрат и каролин.

Препарат представляет собой суспензию красновато-коричневого цвета

1.3 Препарат выпускают во флаконах по 500-1000 мл.

1.4 Тилозинокар хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 18 °С по списку Б. Срок годности – 12 месяцев.

### 2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Тилозинокар обладает широким спектром противомикробного действия, способствует восстановлению сократительной функции матки коров, больных послеродовым гнойно-катаральным эндометритом и регенерации слизистой оболочки матки. Тилозина тартрат накапливается в достаточно высокой концентрации в полостных органах организма животных, что способствует более эффективному этиотропному действию этого препарата при внутриматочном введении. Тилозинокар является малотоксичным препаратом, не обладает аллергическим действием и выводится из организма в течение суток. Слабые кумулятивные свойства отмечаются только при его ежедневном применении. При введении препарата через 48 и 72 часа кумуляции препарата не происходит, и он выводится из организма в течение суток.

### 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1. Показания к применению препарата. Тилозинокар применяют для лечения коров, больных послеродовыми эндометритами. С этой целью тилозинокар предварительно подогревают до температуры 35-40 °С, тщательно взбалтывают содержимое флакона и вводят внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела с интервалом 48 часов до выздоровления.

3.2. Противопоказаний для применения препарата не установлено.

3.3. Убой на мясо разрешается не ранее чем через 72 часа, а использование молока в пищу людям - через 48 часов после последнего применения препарата.

### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать меры личной профилактики, как при работе с малотоксичными препаратами.

### 5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19а и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» высылают невскрытую упаковку препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

Препарат производит: ООО «Белкаролин» РБ г. Витебск Проспект Фрунзе, 81 тел. 24-00-25; тел/факс 24-75-92