

ИНСТРУКЦИЯ **по применению препарата «ТИНИДАФАРМ-Т»**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Тинидафарм-Т (Tinidapharmum-T)

1.2 Препарат представляет собой таблетки плоскоцилиндрической формы от белого до кремового цвета.

1.3 В каждой таблетке массой 0,750 г содержится 500,0 мг тинидазола, в таблетке массой 0,375 г содержится 250,0 мг тинидазола.

1.4 Тинидафарм-Т выпускают в полимерной таре, полиэтиленовых пакетах, двойных полиэтиленовых пакетах, пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 250, 450, 500, 700 и 1000 шт.

Тинидафарм-Т хранят в упаковке изготовителя по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0⁰ до плюс 25⁰С.

Срок годности - 2 (два) года от даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Тинидазол, входящий в состав препарата, губительно действует на многих простейших: трихомонад, балантидий, амёб и гистомонад. Препарат также обладает активностью в отношении анаэробных бактерий (споро- и неспорообразующих).

2.2 Тинидазол в своем составе содержит нитрогруппу, которая выступает акцептором протона водорода, в результате чего нарушает клеточное дыхание возбудителя.

2.3 Тинидазол хорошо всасывается из пищеварительного тракта, проникает в органы и ткани, проходит через плаценту и гематоэнцефалический барьер, накапливается в печени. Период полувыведения составляет 6 – 8 часов. Выводится из организма с мочой в основном в неизменном виде через 1 – 2 суток.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Тинидафарм-Т применяют для лечения коров и быков-производителей при трихомонозе, свиней при балантидиозе и амёбной дизентерии, мелких домашних животных при смешанной анаэробно-аэробной инфекции, птиц при гистомонозе.

3.2 При трихомонозе крупному рогатому скоту препарат назначают внутрь дважды в день, в течение 3 – 4 дней в дозе 10,0 мг/кг массы (по АДВ).

При балантидиозе свиньям массой до 40 кг назначают в дозе 0,25 г, свыше 40 кг – 0,5г (по АДВ) на животное, два раза в день несколькими курсами в течение 3 – 5 дней.

Мелким домашним животным при анаэробно-аэробной инфекции таблетки назначают орально в дозе 5 – 10 мг/кг (по АДВ) 2 раза в день в течение 5 – 7 дней.

Птице для профилактики и лечения гистомоноза Тинидафарм-Т (предварительно измельчив) применяют с кормом. С профилактической целью 0,5 г тинидазола (по АДВ) смешивают с 1,0 кг корма. С лечебной целью 1,5 г тинидазола (по АДВ) смешивают с 1,0 кг корма. Лечение проводят в течение 9 дней и переходят на профилактические дозы.

3.3 Препарат противопоказан беременным, лактирующим и имеющим индивидуальную чувствительность к тинидазолу животным.

3.4 При лечении препаратом возможно развитие кандидоза, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), что требует назначения противогрибковых препаратов и противогистаминных средств соответственно. При наличии побочных эффектов дачу препарата прекращают.

3.5 Молоко от дойных животных разрешается использовать в пищу не ранее чем через 36 часов после последнего назначения препарата.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 5 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 СП «Ветинтерфарм» ООО, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серафимовича, 13-25

Инструкция по применению препарата «Тинидафарм-Т» подготовлена сотрудниками кафедр паразитологии (Петрукович В.В.), фармакологии и токсикологии (Ятусевич И.А., Петров В.В) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и СП «Ветинтерфарм» ООО

