

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата ветеринарного «ОЛАКВИНДОКС 10%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Олаквиндокс 10% (Olaquinoxum 10%).
- 1.2 Олаквиндокс 10% - противомикробный препарат, представляющий собой однородный порошок желтого цвета без посторонних включений.
- В 100 г препарата содержится 10 г олаквиндокса (2-(N-2-гидрооксиметилкарбамил)-3-метилхиноксалин-1,4-диоксид) и наполнитель.
- 1.3 Препарат выпускают в полиэтиленовых пакетах, двойных полиэтиленовых пакетах, пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки, полимерной таре по 50, 100, 200, 500; 1000 г и мешках бумажных многослойных по 5; 10; 20; 25 кг.
- 1.4 Препарат хранят в упаковке изготовителя по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 до плюс 35°С.
- Срок годности - 2 (два) года с даты изготовления.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Входящий в состав препарата олаквиндокс обладает антибактериальным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, улучшает секреторно-моторную и ферментативную функцию желудочно-кишечного тракта, что способствует лучшей ассимиляции питательных веществ рациона.
- 2.2 Олаквиндокс 10% при введении внутрь быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает в органы и ткани животного. Из организма выводится преимущественно с мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Олаквиндокс 10% применяют для профилактики и лечения желудочно-кишечных и респираторных заболеваний (гастроэнтерита, пневмонии, колибактериоза, сальмонеллеза и др.), а также для повышения эффективности роста свиней, телят и птицы.
- 3.2 С профилактической целью препарат применяют в смеси с кормом один раз в сутки в течение 10-14 дней с перерывами между циклами 7-10 дней в следующих дозах: свиньям и телятам – 50 мг/кг, птице – 25 мг/кг живой массы.
- 3.3 С лечебной целью, а также отстающим в росте животным и птице олаквиндокс 10% применяют в смеси с кормом 1-2 раза в сутки в течение 15-20 дней с перерывами между циклами 7-10 дней в дозах: свиньям и телятам – 100 мг/кг, птице – 50 мг/кг живой массы.
- 3.4 В некоторых случаях наблюдается фотосенсибилизирующее действие препарата.
- 3.5 Противопоказанием является повышенная индивидуальная чувствительность животных и птиц к олаквиндоксу.
- 3.6 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 дней после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо, яйца могут быть использованы на корм плотоядным животным.
- 3.7 Запрещен к применению на территории Республики Беларусь для всех видов продуктивных животных.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 СП «Ветинтерфарм» ООО

Республика Беларусь, 220033 г. Минск, ул. Серафимовича, 13-25

Инструкция разработана СП «Ветинтерфарм» ООО, РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» (М.П.Кучинский).

